



PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DE LETSELLIJST

Blad 2-4

8 schalen van uitkeringen voor immateriële schade.
Per schaal worden de bepalende factoren vermeld.

Vanaf blad 5

De letsellijst is onderverdeeld:

- **in 8 categorieën (bladzijde 6-9)**
- **naar lichaamsdeel (bladzijde 10-16)**

Schaal

550,-

Lichamelijk letsel uit categorie 1
of psychisch letsel ten gevolge van:

- zedenmisdrif (bijvoorbeeld onzedelijk betasten) zonder binnendringen, eenmalig, met gering geweld
- bedreiging met mes bij overval
- bedreiging met vuurwapen bij overval, niet rechtstreeks en op afstand

Overige factoren:

- minimaal 6 weken ongeschiktheid voor dagtaak
- algeheel herstel
- tijdelijk verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep mogelijk)

Schaal

1.400,-

Combinaties van factoren uit de lagere schaal
of lichamelijk letsel uit categorie 2
of psychisch letsel ten gevolge van:

- zedenmisdrif zonder binnendringen, gedurende kortere periode, met gering geweld
- onzekerheid over uitslag test besmetting met HIV-virus
- langdurige bedreiging met mes c.q. rechtstreekse bedreiging op afstand met vuurwapen bij overval
- oppervlakkige snijwonden bij overval
- brandstichting (slachtoffer aanwezig, maar zonder brandwonden)
- stalking
- herhaaldelijk huiselijk geweld (zonder seksueel geweld)
- posttraumatische stress

Overige factoren:

- minimaal 6 weken ongeschiktheid voor dagtaak
- minder dan 3 weken ziekenhuisopname
- algeheel herstel
- tijdelijk verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep mogelijk)

Schaal

2.100,-

Combinaties van factoren uit de lagere sch(a)l(en)
of lichamelijk letsel uit categorie 3
of psychisch letsel ten gevolge van:

- zedenmisdrif zonder binnendringen, gedurende langere periode
- overval, naar aard en gevolgen ernstiger dan schaal 2
- posttraumatische stress

Overige factoren:

- zie schaal 2, maar gevolgen ernstiger

Schaal 4

2.750,-

Combinaties van factoren uit de lagere schaal(en)

of lichamelijk letsel uit categorie 4

of psychisch letsel ten gevolge van:

- zedenmisdrif zonder binnendringen, gedurende langere periode
- zedenmisdrif met binnendringen, eenmalig, met gering geweld
- herhaaldelijk huiselijk geweld met seksueel geweld
- rechtstreekse bedreiging met vuurwapen bij overval
- niet-oppervlakkige (steek)wonden bij overval
- posttraumatische stress.

Overige factoren:

- meer dan 3 weken ziekenhuisopname
- langdurige medische behandeling
- maandenlange ongeschiktheid voor dagtaak
- verminderde kans op algeheel herstel
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- langdurig (enig) verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep moeilijk).

Schaal 5

4.150,-

Combinaties van factoren uit de lagere schaal(en)

of lichamelijk letsel uit categorie 5

of psychisch letsel ten gevolge van:

- zedenmisdrif met binnendringen
- rechtstreekse bedreiging met vuurwapen van lange duur bij overval
- rechtstreekse bedreiging met vuurwapen bij overval in eigen woning
- schotwonden bij overval
- posttraumatische stress.

Overige factoren:

- meer dan 6 weken ziekenhuisopname
- medische behandeling/revalidatie langer dan 1 jaar
- maandenlange ongeschiktheid voor dagtaak
- geen uitzicht op algeheel herstel
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- langdurig verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep moeilijk).

Schaal

5.500,-

Combinaties van factoren uit de lagere schaal(en)

of lichamelijk letsel uit categorie 6

of psychisch letsel ten gevolge van:

- zedenmisdrif met binnendringen, met verzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld veel geweld, in eigen woning, besmetting met seksueel overdraagbare aandoening)
- ernstige vorm van posttraumatische stress.

Overige factoren:

- meer dan 3 maanden opname in ziekenhuis of psychiatrische kliniek
- medische behandeling/revalidatie langer dan 1 jaar
- maanden- tot jarenlange ongeschiktheid voor dagtaak
- geen uitzicht op algeheel herstel
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- blijvend (enig) verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep niet of niet volledig mogelijk).

Schaal

8.250,-

Combinaties van factoren uit de lagere schaal(en) of lichamelijk letsel uit categorie 7 of psychisch letsel ten gevolge van:

- zedenmisdrif met binnendringen, onder zeer ernstige omstandigheden, met zeer ernstig lichamelijk letsel
- zeer langdurige niet-stabiele toestand of karakterwijziging.

Overige factoren:

- meer dan 6 maanden opname in ziekenhuis of psychiatrische kliniek
- levenslange medische behandeling en controle
- blijvende ongeschiktheid voor dagtaak
- blijvende gedeeltelijke invaliditeit
- blijvend verlies van arbeidsvermogen (hervatting oude beroep niet mogelijk).

Schaal

9.100,-

Combinaties van factoren uit de lagere schaal(en)

of lichamelijk letsel uit categorie 8

of psychisch letsel ten gevolge van:

- blijvende algehele lichamelijke afhankelijkheid
- blijvende ernstige lichamelijke misvormingen.

Overige factoren:

- blijvende opname in verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
- volledige invaliditeit.



LETSELLIJST

Deze lijst is in 1988/1999 opgesteld en in 2007 herzien door P. M. A. van der Brugh, arts, medisch adviseur van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Deze lijst geeft een verdere onderverdeling van het lichamelijke letsel. Het cijfer dat bij het beschreven letsel staat, verwijst naar de categorie van de immateriële schade en de bijbehorende tegemoetkoming. De schaal van de immateriële schade en daarmee de hoogte van de tegemoetkoming loopt op naarmate het letsel ernstiger is en /of blijvende gevolgen met zich meebrengt. Ook een lange(re) behandelduur en de complexiteit van de behandeling kunnen van invloed zijn op de hoogte van de tegemoetkoming.

De lichamelijke letsellijst is onderverdeeld:

- naar categorie (bladzijde 6-9)
- naar lichaamsdeel (bladzijde 10-16)

Categorie



- Lichte hersenschudding met ziekenhuisopname, tenzij uit medische gegevens blijkt dat de opname gewenst/noodzakelijk was door overmatig alcoholgebruik en achteraf niet van ander c.q. ernstig letsel is gebleken.
- Hoofdhuidverwondingen bij vrouwen met kaalheid en/of andere cosmetische afwijkingen.
- Fracturen van de schedel zonder impressie (d.w.z. verplaatsing van de fractuurdelen t.o.v. elkaar).
- Tijdelijke gedeeltelijke uitval van het gezichtsvermogen (= visus) van één oog.
- Blijvende substantiële vormverandering van een oorschelp.
- Perforatie van een trommelvlies, waarvoor eenmalige operatieve behandeling nodig is.
- Perforatie van beide trommelvliezen.
- Fractuur van de neus, in combinatie met operatieve behandeling, inwendig en/of uitwendig.
- Fractuur van een oogkas, zonder operatieve behandeling.
- Fractuur van een jukbeen, zonder operatieve behandeling.
- Het verlies van één of meer frontale gebitselementen.
- Fractuur van de processus alveolaris (=benige richel van de kaak waarin de gebitselementen gevat zijn).
- Acceleratie/deceleratie trauma van de halswervelkolom.
- Fractuur van duim of wijsvinger of de bijbehorende middenhandsbeentjes, niet operatief behandeld, zonder complicaties en/of afwijkende stand of functiebeperking genezen.
- Peesletsel aan een vinger met blijvend beperkt functieverlies, niet zijnde duim of wijsvinger.
- Fractuur van een voetwortelbeentje.
- Ribfracturen van meer dan 2 ribben zonder beschadiging van inwendige organen.
- Fractuur van het borstbeen, zonder complicaties genezen.
- Klaplong (=pneumothorax) zonder drainage behandeld.
- Oppervlakkige messteekverwonding van de buikhuid.
- Wervel(impressie)fractuur zonder verplaatsing van de fractuurdelen t.o.v. elkaar(dislocatie).
- Ontsierende littekens t.g.v. glas en/of messen.

Categorie



- Blijvend verlies van reuk en/of smaak.
- Perforatie van een trommelvlies, waarna een blijvend geruis resteert.
- Fractuur van een oogkas, met operatieve behandeling.
- Fractuur van een jukbeen, met operatieve behandeling*.
- Fractuur van een oogkas/jukbeencomplex, zonder operatieve behandeling.
- Fractuur van de onderkaak zonder operatieve behandeling.
- Fractuur van de bovenkaak, zonder operatieve behandeling.
- Fractuur van een ellepijp (ook wel pareerfractuur) of van het spaakbeen of een combinatie van beide, zonder operatieve behandeling.
- Polsfractuur, zonder operatieve behandeling.
- Fracturen van duim en wijsvinger en/of fracturen van overige vingers, die operatief zijn behandeld.
- Littekens aan een of beide borsten bij vrouwen.

- Klaplong behandeld d.m.v. drainage.
 - Litteken van de buikhuid na proefoperatie (proeflaparotomie), waarbij geen inwendig letsel is vastgesteld.
 - Leverletsel, incl. gedeeltelijke verwijdering, vastgesteld d.m.v. laparotomie.
 - Fractuur schouderblad.
 - Traumatisch geïnduceerde rughernia (hernia nucleii pulposii).
 - Wervelfractuur leidend tot langdurig veel klachten, lang (vele maanden) fysiotherapie, noodzaak tot het dragen van een corset e.d.
 - Fracturen van het bekken.
 - Fractuur van een knieschijf, niet operatief behandeld.
 - Fractuur van een kuitbeen (= fibula).
 - Traumatisch geïnduceerde meniscus-laesie, per kijkoperatie behandeld.
 - Fractuur van een scheenbeen (= tibia).
 - Fractuur van het hielbeen (= calcaneus).
 - Enkelfractuur, niet operatief behandeld
 - Ontsierende littekens t.g.v. chemicaliën en/of brandwonden van beperkt oppervlak.
 - Littekens over een groter oppervlak.
-
- Zware hersenschudding (= contusio cerebri) zonder uitvalsverschijnselen.
 - Trauma van de oogbol, leidend tot een verhoogde kans op staar (=cataract) en/of netvliesloslating (=ablatio retinae).
 - Perforatie van een trommelvlies met blijvend gedeeltelijk gehoorverlies in het spraakgebied.
 - Fractuur van het oogkas/jukbeencomplex, met operatieve behandeling*.
 - Fractuur van de onderkaak, met operatieve behandeling*.
 - Fractuur van de bovenkaak, met operatieve behandeling*.
 - Schouder uit de kom (=luxatie) met herstelplaatsing onder narcose
 - Plexuslaesie (=zenuwverbinding) met aantasting/uitval van de gevoelskwaliteit in de arm of hand
 - Fractuur van een ellepijp (ook wel pareerfractuur) of van het spaakbeen of een combinatie van beide, met operatieve behandeling.
 - Polsfractuur met operatieve behandeling.
 - Bloedvat- en/of zenuwletsel in een arm, leidend tot reconstructieve operatie(s).
 - Fractuur van het opperarmbeen op latere leeftijd, niet operatief behandeld.
 - Zenuwletsel van de hand, leidend tot reconstructieve operatie(s).
 - Zenuwletsel (nervus ulnaris), leidend tot een z.g. klauwhand.
 - Bloeding in de bortsolte (Hematothorax) behandeld door drainage.
 - Spanningspneumothorax.
 - Perforatie van maag of darm, vastgesteld per laparotomie.
 - Enkelfractuur, operatief behandeld en ongecompliceerd genezen.
 - Fractuur van een knieschijf, operatief behandeld.
 - Voorste kruisband (knie) ruptuur.
 - Fractuur van een scheenbeen in het gewricht (= tibiaplateau).
 - Fracturen van kuit- en scheenbeen.
 - Bloedvatletsel in de benen, leidend tot reconstructieve operatie(s).
 - Zenuwletsel in het been, leidend tot reconstructieve operatie(s).
 - Zenuwletsel in het been met blijvende uitval, waarvoor geen operatieve behandeling mogelijk is.

Categorie

- Aangezichtshuidverwonding met als gevolg een cosmetisch storende uitval van de zenuw die de aangezichtsspieren bedient (=facialisparese/paralyse).
- Blijvende gedeeltelijke uitval van het gezichtsvermogen aan één oog.
- Traumatisch cataract.
- Geheel functioneel verlies van één oor. Perforatie van een trommelvlies met blijvend algeheel gehoorverlies in het oor.
- Plexuslaesie met uitval van de grove motoriek.
- Fractuur in/door het ellebooggewricht, met operatieve behandeling.
- Fractuur van het opperarmbeen op jongere leeftijd operatief behandeld.
- Fracturen of andere traumata van onderarm/hand, leidend tot beperkte functiestoringen.
- Zenuwletsel (nervus medianus), leidend tot een z.g. predikershand.
- Zenuwletsel (nervus radialis), leidend tot een z.g. dropping hand.
- Verlies of ernstige functiebeperking van duim en/of wijsvinger van de niet-dominante hand.
- Beschadiging van het hartspierweefsel zonder hemodynamische (= t.a.v. de bloedsomloop) gevolgen.
- Miltletsel, vastgesteld d.m.v. laparotomie.
- Totale of subtotale verwijdering van de milt.
- Beschadiging van een nier gepaard gaande met functieverlies.
- Fractuur of andere traumata van onderbeen/voet, leidend tot reflexdystrofie met beperkte klachten.
- Fractuur van dijbeen (femur) met of zonder operatie.
- Fractuur of andere traumata van onderbeen/voet, leidend tot reflexdystrofie met ernstige of langdurige klachten.
- Fracturen van een dijbeenhals (= heup) met of zonder operatie.

Categorie

- Zware hersenschudding met voorbijgaande posttraumatische epilepsie.
- Totale blijvende uitval van het gezichtsvermogen in één oog (= functioneel verlies van één oog).
- Functioneel + anatomisch verlies van één oog.
- Plexuslaesie met uitval van grove + fijne motoriek (vnl. vingerbewegingen).
- Fracturen van spaakbeen en/of ellepijp van de dominante arm/hand, leidend tot ernstig functieverlies.
- Fracturen of andere traumata van onderarm/hand, leidend tot ernstige of zeer langdurige functiestoringen.
- Verlies of ernstige functiebeperking van duim of wijsvinger van de dominante hand.
- Peesletsel met blijvend functieverlies van duim en wijsvinger van de dominante hand.
- Beschadiging van de hartspier met hemodynamische gevolgen, zich uitend in bv. verminderde inspanningstolerantie, al of niet gecombineerd met de noodzaak van levenslange SBE (subacute bacteriële endocarditis) profylaxe en/of langdurige antistolling.
- Longweefselbeschadiging met daardoor invaliderende beperking van de longcapaciteit (= inspanningstolerantie).
- Perforatie van de darm met aanleg van een tijdelijk stoma.
- Beschadiging van de urinewegen leidend tot blijvende incontinentie.
- Fractuur van één wervel met dislocatie en operatieve behandeling.
- Fracturen van een dijbeenhals (= heup) met operatie en verlies onafhankelijkheid.

Categorie

- Zware hersenschudding met blijvende posttraumatische epilepsie.
- Functioneel + anatomisch verlies van één oog met daarbij ernstige ontsiering van het gelaat.
- Perforatie van de darm met aanleg van een definitief stoma.
- Beschadiging van de urinewegen leidend tot de aanleg van een definitief stoma.
- Beschadiging van de inwendige geslachtsorganen.
- Fracturen van kuit- en/of scheenbeen, leidend tot herhaalde operatieve ingrepen al of niet gepaard gaande met vertraagde consolidatie (= aan elkaar groeien van het bot) en/of pseudoartrosevorming.
- Besmetting met Hepatitis B.
- Besmetting met HIV-virus.

Categorie

- Organisch-psychoyndroom (= algehele blijvende achteruitgang van de intellectuele vermogens).
- Functioneel verlies van beide oren of het resterende oor.
- Verlies (van een belangrijk deel) van de dominante arm.
- Beschadiging van de inwendige geslachtsorganen bij vrouwen, gepaard gaande met blijvend functieverlies.
- Fracturen van meer dan één wervel en beschadiging van het ruggenmerg met uitval vanaf borstniveau.

- Functioneel al of niet gecombineerd met het anatomisch verlies van beide ogen of het functioneel + anatomisch verlies van het resterende oog (bij een voordien éénogige).
- Dwarslaesie op halsniveau, d.w.z. verlies van gevoel en motoriek vanaf halsniveau naar beneden.
- Verlies van (belangrijke delen) van beide armen.
- Fracturen van meer dan één wervel en beschadiging van het ruggenmerg met uitval vanaf halsniveau.
- Onder- en bovenbeenamputatie.

** Het aanbrengen en het verwijderen van osteosynthese-materiaal (=platen, schroeven e.d.) wordt als 1 operatie aangemerkt.*

INDELING NAAR LICHAAMSDEEL

Hoofd/hersenschedel

- 1 Lichte hersenschudding met ziekenhuisopname, tenzij uit medische gegevens blijkt dat de opname gewenst/noodzakelijk was door overmatig alcoholgebruik en achteraf niet van ander c.q. ernstig letsel is gebleken.
- 1 Hoofdhuidverwondingen bij vrouwen met kaalheid en/of andere cosmetische afwijkingen.
- 1 Fracturen van de schedel zonder impressie (d.w.z. verplaatsing van de fractuurdelen t.o.v. elkaar).
- 2 Blijvend verlies van reuk en/of smaak.
- 3 Zware hersenschudding (= contusio cerebri) zonder uitvalsverschijnselen.
- 4 Aangezichtshuidverwonding met als gevolg een cosmetisch storende uitval van de zenuw die de aangezichtsspieren bedient (=facialisparese/paralyse).
- 5 Zware hersenschudding met voorbijgaande posttraumatische epilepsie.
- 6 Zware hersenschudding met blijvende posttraumatische epilepsie.
- 7 Organisch-psychosyndroom (= algehele blijvende achteruitgang van de intellectuele vermogens).

Oog

- 1 Tijdelijke gedeeltelijke uitval van het gezichtsvermogen (= visus) van één oog.
- 3 Trauma van de oogbol, leidend tot een verhoogde kans op staar (=cataract) en/of netvliesloslating (=ablatio retinae).
- 4 Blijvende gedeeltelijke uitval van het gezichtsvermogen van één oog.
- 4 Traumatisch cataract.
- 5 Totale blijvende uitval van het gezichtsvermogen van één oog (= functioneel verlies van één oog).
- 5 Functioneel + anatomisch verlies van één oog.
- 6 Functioneel + anatomisch verlies van één oog met daarbij ernstige ontsiering van het gelaat.
- 8 Functioneel al of niet gecombineerd met het anatomisch verlies van beide ogen of het functioneel + anatomisch verlies van het resterende oog (bij een voordien éénogige).

Gehoor

- 1 Blijvende substantiële vormverandering van een oorschelp.
- 1 Perforatie van een trommelvlies, waarvoor eenmalige operatieve behandeling nodig is.
- 1 Perforatie van beide trommelvliezen.
- 2 Perforatie van een trommelvlies, waarna een blijvend geruis resteert.
- 3 Perforatie van een trommelvlies met blijvend gedeeltelijk gehoorverlies in het spraakgebied.
- 4 Geheel functioneel verlies van één oor.
Perforatie van een trommelvlies met blijvend algeheel gehoorverlies in het oor.
- 7 Functioneel verlies van beide oren of het resterende oor.

Aangezichtsschedel

- 1 Fractuur van de neus, in combinatie met operatieve behandeling, inwendig en/of uitwendig.
- 1 Fractuur van een oogkas, zonder operatieve behandeling.
- 1 Fractuur van een jukbeen, zonder operatieve behandeling.
- 2 Fractuur van een oogkas, met operatieve behandeling.
- 2 Fractuur van een jukbeen, met operatieve behandeling*.
- 2 Fractuur van het oogkas/jukbeencomplex, zonder operatieve behandeling.
- 2 Fractuur van de onderkaak zonder operatieve behandeling.
- 2 Fractuur van de bovenkaak, zonder operatieve behandeling.
- 3 Fractuur van het oogkas/jukbeencomplex, met operatieve behandeling*.
- 3 Fractuur van de onderkaak, met operatieve behandeling*.
- 3 Fractuur van de bovenkaak, met operatieve behandeling*.

* Het aanbrengen en het verwijderen van osteosynthese-materiaal (=platen, schroeven e.d.) wordt als 1 operatie aangemerkt.

Gebit

- 1 Het verlies van één of meer frontale gebitselementen.
- 1 Fractuur van de processus alveolaris (=benige richel van de kaak waarin de gebitselementen gevat zijn).

Hals

- 1 Acceleratie/deceleratie trauma van de halswervelkolom.
- 3 Plexuslaesie (=zenuwverbinding) met aantasting/uitval van de gevoelskwaliteit in de arm of hand.
- 4 Plexuslaesie met uitval van de grove motoriek.
- 5 Plexuslaesie met uitval van grove + fijne motoriek (vnl. vingerbewegingen).
- 8 Dwarslaesie op halsniveau, d.w.z. verlies van gevoel en motoriek vanaf halsniveau naar beneden.

Arm

- 2 Fractuur van een ellepijp (ook wel pareerfractuur) of van het spaakbeen of een combinatie van beide, zonder operatieve behandeling.
- 2 Polsfractuur, zonder operatieve behandeling.
- 3 Schouder uit de kom (=luxatie) met herstelplaatsing onder narcose.
- 3 Fractuur van een ellepijp (ook wel pareerfractuur) of van het spaakbeen of een combinatie van beide, met operatieve behandeling.
- 3 Polsfractuur met operatieve behandeling.
- 3 Bloedvat- en/of zenuwletsel in een arm, leidend tot reconstructieve operatie(s).
- 3 Fractuur van het opperarmbeen op latere leeftijd, niet operatief behandeld.
- 4 Fractuur in/door het ellebooggewricht, met operatieve behandeling.
- 4 Fractuur van het opperarmbeen op jongere leeftijd operatief behandeld.
- 4 Fracturen of andere traumata van onderarm/hand, leidend tot beperkte functiestoringen.
- 5 Fracturen van spaakbeen en/of ellepijp van de dominante arm/hand, leidend tot ernstig functieverlies.
- 5 Fracturen of andere traumata van onderarm/hand, leidend tot ernstige of zeer langdurige functiestoringen.
- 7 Verlies van (een belangrijk deel) van de dominante arm.
- 8 Verlies van (belangrijke delen) van beide armen.

Hand

- Bij alle handletsels geldt dat het om slachtoffers moet gaan waarbij een eventueel beroep of bezigheid geen bijzondere handvaardigheid vereist.
- 1 Fractuur van duim of wijsvinger of de bijbehorende middenhandsbeentjes, niet operatief behandeld, zonder complicaties en/of afwijkende stand of functiebeperking genezen.
 - 1 Peesletsel aan een vinger met blijvende beperkt functieverlies, niet zijnde duim of wijsvinger.
 - 2 Fracturen van duim en wijsvinger en/of fracturen van overige vingers, die operatief zijn behandeld.
 - 3 Zenuwletsel van de hand, leidend tot reconstructieve operatie(s).
 - 3 Zenuwletsel (nervus ulnaris), leidend tot een z.g. klauwhand.
 - 4 Zenuwletsel (nervus medianus), leidend tot een z.g. predikershand.
 - 4 Zenuwletsel (nervus radialis), leidend tot een z.g. dropping hand.
 - 4 Verlies of ernstige functiebeperking van duim en/of wijsvinger van de niet-dominante hand.
 - 5 Verlies of ernstige functiebeperking van duim of wijsvinger van de dominante hand.
 - 4 Peesletsel met blijvend functieverlies van duim en wijsvinger van de dominante hand.

Borst

- 1 Ribfracturen van meer dan 2 ribben zonder beschadiging van inwendige organen.
- 1 Fractuur van het borstbeen, zonder complicaties genezen.
- 1 Klaplong (=pneumothorax) zonder drainage behandeld.
- 2 Littekens aan een of beide borsten bij vrouwen.
- 3 Bloeding in de bortsolte (Hematothorax) behandeld door drainage.
- 2 Klaplong behandeld d.m.v. drainage.
- 3 Spanningspneumothorax.
- 4 Beschadiging van het hartspierweefsel zonder hemodynamische (= t.a.v. de bloedsomloop) gevolgen.
- 5 Beschadiging van de hartspier met hemodynamische gevolgen, zich uitend in bv. verminderde inspanningstolerantie, al of niet gecombineerd met de noodzaak van levenslange SBE (subacute bacteriële endocarditis) profylaxe en/of langdurige antistolling.
- 5 Longweefselbeschadiging met daardoor invaliderende beperking van de longcapaciteit (= inspanningstolerantie).

Buik

- 1 Oppervlakkige messteekverwonding van de buikhuid.
- 2 Litteken van de buikhuid na proefoperatie (proeflaparotomie), waarbij geen inwendig letsel is vastgesteld.
- 2 Leverletsel, incl. gedeeltelijke verwijdering, vastgesteld d.m.v. laparotomie.
- 3 Miltletsel, vastgesteld d.m.v. laparotomie.
- 3 Perforatie van maag of darm, vastgesteld per laparotomie.
- 4 Totale of subtotale verwijdering van de milt.
- 4 Beschadiging van een nier gepaard gaande met functieverlies.
- 5 Perforatie van de darm met aanleg van een tijdelijk stoma.
- 5 Beschadiging van de urinewegen leidend tot blijvende incontinentie.
- 6 Perforatie van de darm met aanleg van een definitief stoma.
- 6 Beschadiging van de urinewegen leidend tot de aanleg van een definitief stoma.
- 6 Beschadiging van de inwendige geslachtsorganen.
- 7 Beschadiging van de inwendige geslachtsorganen bij vrouwen, gepaard gaande met blijvend functieverlies.

Rug

- 1 Wervel(impressie)fractuur zonder verplaatsing van de fractuurdelen t.o.v. elkaar(dislocatie).
- 2 Fractuur schouderblad.
- 2 Traumatisch geïnduceerde rughernia (hernia nucleï pulposii).
- 2 Wervelfractuur leidend tot langdurig veel klachten, lang (vele maanden) fysiotherapie, noodzaak tot het dragen van een corset e.d.
- 5 Fractuur van één wervel met dislocatie en operatieve behandeling.
- 7 Fracturen van meer dan één wervel en beschadiging van het ruggenmerg met uitval vanaf borstniveau.
- 8 Fracturen van meer dan één wervel en beschadiging van het ruggenmerg met uitval vanaf halsniveau.

Bekken

- 2 Fracturen van het bekken.
- 4 Fracturen van een dijbeenhals (= heup) met of zonder operatie.
- 5 Fracturen van een dijbeenhals (= heup) met operatie en verlies onafhankelijkheid.

Been en voet

- 1 Fractuur van een voetwortelbeentje.
- 2 Fractuur van een knieschijf, niet operatief behandeld.
- 2 Fractuur van een kuitbeen (= fibula).
- 2 Traumatisch geïnduceerde meniscus-laesie, per kijkoperatie behandeld.
- 2 Fractuur van een scheenbeen (= tibia).
- 2 Fractuur van het hielbeen (= calcaneus).
- 2 Enkelfractuur, niet operatief behandeld.
- 3 Enkelfractuur, operatief behandeld en ongecompliceerd genezen.
- 3 Fractuur van een knieschijf, operatief behandeld.
- 3 Voorste kruisband (knie) ruptuur.
- 3 Fractuur van een scheenbeen in het gewricht (= tibiaplateau).
- 3 Fracturen van kuit- en scheenbeen.
- 3 Bloedvatletsel in de benen, leidend tot reconstructieve operatie(s).
- 3 Zenuwletsel in het been, leidend tot reconstructieve operatie(s).
- 3 Zenuwletsel in het been met blijvende uitval, waarvoor geen operatieve behandeling mogelijk is.
- 4 Fractuur of andere traumata van onderbeen/voet, leidend tot reflexdystrofie met beperkte klachten.
- 4 Fractuur van dijbeen (femur) met of zonder operatie.
- 4 Fractuur of andere traumata van onderbeen/voet, leidend tot reflexdystrofie met ernstige of langdurige klachten.
- 6 Fracturen van kuit- en/of scheenbeen, leidend tot herhaalde operatieve ingrepen al of niet gepaard gaande met vertraagde consolidatie (= aan elkaar groeien van het bot) en/of pseudoartrosevorming.
- 6 Onder- en bovenbeenamputatie.

Algemeen letsel

- 1 Ontsierende littekens t.g.v. glas en/of messen.
- 2 Ontsierende littekens t.g.v. chemicaliën en/of brandwonden van beperkt oppervlak.
Littekens over een groter oppervlak.
- 6 Besmetting met Hepatitis B.
- 6 Besmetting met HIV-virus.

Aan de gebruikers van dit boekje

Slachtoffers van een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, die daardoor ernstig (lichamelijk en/of geestelijk) letsel hebben opgelopen en die voor het overige aan alle wettelijke vereisten voldoen, kunnen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven in aanmerking komen voor een uitkering wegens (im)materiële schade.

De uitkering voor immateriële schade is in categorieën (schalen) onderverdeeld. Deze schalen, die zich gedurende het dertigjarige bestaan van het Schadefonds hebben ontwikkeld tot wat zij nu zijn, zijn door het Schadefonds in nauwe samenwerking met haar medisch adviseurs recent opnieuw vastgesteld. Hierbij is nog meer nuance dan voorheen aangebracht.

Dit boekje is uitdrukkelijk geen overzicht waarin u opzoekt op welk bedrag u aanspraak kunt maken. Het geeft u slechts een indicatie welke uitkering bij welk letsel hoort. Hierbij spelen bij de feitelijke uitkering diverse factoren een rol: de belangrijkste is aard en ernst van het letsel.

Andere factoren die een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de uitkering wegens immateriële schade zijn bijvoorbeeld de persoonskenmerken van het slachtoffer (zoals leeftijd), de individuele omstandigheden (zoals het verlies van een baan, niet langer een hobby kunnen uitoefenen, al eerder slachtoffer geweest zijn van een geweldsmisdrijf), de omstandigheden waaronder het misdrijf heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld thuis, binnen een relatie) en de directe gevolgen van het letsel (hevige pijn, lange duur van herstel, lang verblijf in het ziekenhuis en/of verpleeghuis).

Dit boekje is bedoeld om inzicht te geven in hoe het Schadefonds de hoogte van de immateriële schade vaststelt. Daarbij is het Schadefonds gebonden aan een maximumbedrag en dat is voor de immateriële schade € 9.100,00.

Een vergelijking tussen de bedragen in dit boekje en de bedragen die door de (civiele) rechter worden toegekend gaat vaak niet op. De (civiele) rechter is namelijk niet aan een maximum gebonden.

Rijswijk, november 2007

Colofon

Uitgave:

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Samenstelling en eindredactie:

dhr. P. M. A. van den Brugh, arts

dhr. J. C. B. M. Rensing, arts

mw. A. E. van Dijk


mw. J. C. Sikkens

Concept en realisatie:

Plan (Agnes van der Pol), Breda

Druk:

Koninklijke Broese en Peereboom, Breda





SGGM



Schadefonds Geweldsmisdrijven

Letseellijst

